

Impfkalender 2017/2018 – Welche Impfungen sind empfohlen?

Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO), Stand August 2017

Impfungen	Säuglinge und Kleinkinder (2 – 23 Monate)				Kinder und Jugendliche (2 – 17 Jahre)				Erwachsene (ab 18 Jahre)	
	6 Wochen	2 Monate	u4 3 Monate	u6 11–14 Monate	u7 15–23 Monate	2–4 Jahre	u9 5–6 Jahre	11 9–14 Jahre	ab 18 Jahre	ab 60 Jahre
Tetanus		G1	G2	G3	G4	N	A1	A2	A (alle 10 Jahre)	
Diphtherie			G2	G3	G4	N	A1	A2	A (alle 10 Jahre)	
Keuchhusten (Pertussis)			G2	G3	G4	N	A1	A2	A ^d	
Hib (Haemophilus influenzae Typ b)						N				
Kinderlähmung (Poliomyelitis)						N		A	ggf. N	
Hepatitis B						N				S ^f
Pneumokokken		G1 ^b		G2	G3	N				
Rotaviren	G1 ^a	G2	(G3)							
Meningokokken C				G (ab 12 Monaten)		N				
Masern				G1	G2	N			S ^e	
Mumps				3-fach- Impfung MMR	3-fach- Impfung MMR + Windpocken	N				
Röteln				G1	G2	N				
Windpocken (Varizellen)				G1	G2	N				
Gebärmutterhalskrebs (HPV)										
Grippe (Influenza)								♀ G1+G2 ^c		S (jährlich)

Personen mit chronischen Erkrankungen (jährlich) und für Schwangere

- U** Impftermin bei Früherkennungsuntersuchung Kinder
- G** Grundimmunisierung (bis zu vier Teilimpfungen G1–G4)
- S** Standardimpfung
- ♀** Impfpfehlungen für Mädchen und junge Frauen
- J** Impftermin bei Früherkennungsuntersuchung Jugendliche
- N** Nachholimpfung (bei unvollständigem Impfschutz)
- A** Auffrischimpfung
- a** die 1. Impfung möglichst ab vollendeter 6. Lebenswoche, je nach Impfstoff 2 bzw. 3 Schluckimpfungen (G2/G3) mit einem Mindestabstand von 4 Wochen
- b** Frühgeborene erhalten eine zusätzliche Impfung im Alter von 3 Monaten (insgesamt 4 Impfungen)
- c** je nach Impfstoff 2 Impfungen im Alter von 9–13 bzw. 9–14 Jahren, bei Nachholen der Impfung beginnend im Alter >13 bzw. 14 Jahren 3 Impfungen
- d** einmalige Auffrischung; möglichst mit der nächsten Impfung gegen Tetanus/Diphtherie/ggf. Poliomyelitis
- e** Impfung für alle nach 1970 Geborene mit unklarem Immunschutz
- f** Impfung mit sogenanntem Polysaccharid-Impfstoff